

Viticulture

PACA

n°18
2 juillet 2019



Référent filière & rédacteur

Elisabeth RICAUD
CIRAME
ricaud-e@agrometeo.fr

Directeur de publication

André BERNARD
Président de la chambre régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte
d'Azur
Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service régional de l'Alimentation
PACA
132 boulevard de Paris
13000 Marseille



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Climatologie

- [Canicule](#)

Phénologie

- [Grenache](#)
- [Muscat de Hambourg](#)

Maladie

- [Mildiou](#)
- [Black-Rot](#)
- [Oïdium](#)
- [Flavescence dorée](#)

Ravageurs

- [Vers de la grappe](#)

Informations



[Les abeilles butinent, protégeons les !](#)



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA

Sur certaines parcelles, les températures caniculaires de ces derniers jours, associées à des vents très chauds, ont brûlé le feuillage ainsi que les baies. De plus, de graves phytotoxicités en lien avec l'association de produits phytosanitaires sont observées.

Brûlure des baies (phytotoxicité)



Photos : CA26


Brûlure des feuilles et grappes



Photos : CA84


PHENOLOGIE

Photos : CA84



Pois 5-6 mm

Stade baies 5-6 mm



Fermeture

Stade fermeture

Grenache

Secteur 0	Secteur I	Secteur II	Secteur III	Secteur IV	Secteur V
	Baies de 6-7 mm à fermeture	Baies de 4-5 mm à fermeture	Baies de 4-5 à 10-12 mm	Baies 4-5 à 10-12 mm	Baies de 2-3 à 6-7 mm
Stade fermeture majoritaire	Stade baies 10-12 mm majoritaire	Stade baies 8-10 mm majoritaire	Stade baies 7-8 mm majoritaire	Stade baies 6-7 mm majoritaire	Stade baies 4-5 mm majoritaire

Muscat de Hambourg

Secteur II	Secteur III	Secteur IV	Secteur V
Stade pré-fermeture	Stade baies 10-12 mm	Stade baies 7-8 mm	Stade baies 6-7 mm

[Carte de précocité](#)

MILDIU

Biologie : [Cf bulletin n°2](#)

Taches de mildiou sur feuilles



Photo CIRAME

Mildiou sur grappe : rot brun



Photo CA13

Prophylaxie : [Cf bulletin n°2](#)

Territoire sud Drôme/Côtes du Rhône/Vallée du Rhône

Analyse du risque

Les conditions climatiques de cette semaine n'ont pas été favorables à de nouvelles contaminations, excepté très localement (orages). Les symptômes issus des orages seront à rechercher à partir du 12 juillet. Les valeurs des EPI (Etat Potentiel d'Infection) sont majoritairement en baisse de 1 à 3 points, en hausse sur les secteurs avec orages les 29/30 juin.

Observations

De nouveaux symptômes, issus des pluies du 15 juin sont observés localement. Sur 83 parcelles du réseau, observées du 26 juin au 2 juillet, 14 parcelles présentent des symptômes sur feuilles.

Parcelles natures : sur 9 parcelles natures du territoire, sept parcelles présentent des symptômes sur feuilles, une parcelle des symptômes sur grappes.

Estimation du risque

Sur secteurs sans pluie depuis le 11 juin



En cas de pluie



Sur secteurs avec pluies après le 11 juin (14/15, 19/20, 29/30 juin)



En cas de pluie



Territoire sud Luberon/Bouches du Rhône/Ste Victoire

Analyse du risque

Les conditions climatiques de cette semaine n'ont pas été favorables à de nouvelles contaminations. Les valeurs des EPI (Etat Potentiel d'Infection) sont en baisse de 1 à 3 points en moyenne.

Observations

Quelques nouveaux symptômes issus des pluies du 11 juin sont observés. Sur 37 parcelles du réseau, observées du 26 juin au 2 juillet, 12 parcelles présentent des symptômes sur feuilles, une parcelle des symptômes sur grappes.

Parcelles natures : sur 5 parcelles natures du territoire, toutes présentent des symptômes sur feuilles, trois parcelles des symptômes sur grappes.

Estimation du risque

En l'absence de symptôme et de pluie



En cas de pluie, sur parcelles avec symptômes



Territoire Provence

Analyse du risque

Les conditions climatiques de cette semaine n'ont pas été favorables à de nouvelles contaminations, Les valeurs des EPI (Etat Potentiel d'Infection) du modèle Potentiel Système sont en baisse de 1 à 4 points.

Observations

Pas de nouveaux symptômes. Sur 38 parcelles observées du 26 juin au 2 juillet, sept parcelles présentent des symptômes sur feuilles, une parcelle des symptômes sur grappes.

Estimation du risque

En l'absence de pluie



En cas de pluie



BLACK-ROT

Biologie : [Cf bulletin n°2](#)

Tache de black-rot avec des pycnides



Photo CA26

Black-rot sur grappes



Photo CA26

Analyse du risque

Les conditions climatiques de cette semaine n'ont pas été favorables à de nouvelles contaminations.

Observations

Sur 148 parcelles du réseau, observées du 26 juin au 2 juillet, cinq parcelles présentent des symptômes sur feuilles, une parcelle des symptômes sur grappes.

[Parcelles natures](#) : nouveaux symptômes observés.

Sur 12 parcelles natures observées, cinq parcelles présentent des symptômes sur feuilles, deux parcelles des symptômes sur grappes.

Estimation du risque

Sur les parcelles historiquement sensibles et parcelles avec symptômes, en cas de pluie



AUCUN	FAIBLE	MODÉRÉ	FORT	TRÈS FORT	ALERTE
-------	--------	--------	------	-----------	--------

En l'absence de symptôme et de pluie



AUCUN	FAIBLE	MODÉRÉ	FORT	TRÈS FORT	ALERTE
-------	--------	--------	------	-----------	--------

OÏDIUM

Biologie : [Cf bulletin n°2](#)

Oïdium sur feuilles



Photo CA83

Oïdium sur grappes




Photo CA83

Observations

Bilan oïdium sur feuilles sur 109 parcelles : fréquence et intensité

Seulement 4% des parcelles ont plus de 10 % feuilles avec présence d'oïdium.



Observations sur grappes

Sur 140 parcelles du réseau, observées du 26 juin au 2 juillet, 11 parcelles présentent des symptômes sur grappes.

[Parcelles natures](#) : sur 14 parcelles natures observées, quatre parcelles présentent des symptômes sur grappes.

Estimation du risque

Stade fermeture de la grappe atteint



Cas contraire



Faire les bilans sur grappes la semaine prochaine en secteurs très précoces et précoces.

FLAVESCENCE DOREE : maladie de quarantaineBiologie : [Cf bulletin n°7](#)

Les communiqués DRAAF-SRAL PACA et Auvergne Rhône Alpes concernant la lutte obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne est en ligne sur les sites habituels. Ci-dessous les liens pour y accéder

[Communiqué du 5 juin \(site DRAAF PACA\)](#)[Communiqué du 5 juin \(site CIRAME\)](#)[Communiqué DRAAF Auvergne Rhône Alpes](#)

VERS DE LA GRAPPE : deuxième génération

Biologie : Cf bulletin n°1

Pontes



oeufs

Photo CA83

Larve d'Eudémis



Larve de Cochylis



Observations

Le vol diminue en secteur très précoce. Pontes observées en secteur tardif. Premières jeunes larves observées en secteur médian.

Prévisions du modèle ACTIV

	Premières larves L3
Secteur très précoce	25-27 juin
Secteur précoce	29 juin – 2 juillet
Secteur médian	7-8 juillet
Secteur tardif	9-11 juillet
Secteur très tardif	12 juillet

Estimation du risque



Cas général



Très localement

AUCUN

FAIBLE

MODÉRÉ

FORT

TRÈS FORT

ALERTE

AUCUN

FAIBLE

MODÉRÉ

FORT

TRÈS FORT

ALERTE

Note technique nationale relative aux résistance en vigne est en ligne.

[Note technique 2019](#)

[Liste des produits de biocontrôle](#)

Parcelles natures

Le réseau « parcelles natures » est un réseau de parcelles ne recevant aucune protection phytosanitaire. L'observation de ce réseau est financée par la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur.

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales.

Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

CIRAME : Ricaud Elisabeth

Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône : Richy Didier

Chambre d'agriculture de la Drôme : Vigne Julien

Chambre d'agriculture de Var : Mazeau Julie

Chambre d'agriculture du Vaucluse : Vandamme Rémi

Observations

Association des Vignerons de la Sainte Victoire

CAPL

Chambres d'Agriculture Bouches du Rhône, Drôme, Var et Vaucluse

CoopAzur JARDICA

Domaine expérimental La Tapy

Scan

Soufflet Vigne

Financement

Action pilotée par les Ministères chargés de l'Agriculture et de la Transition Écologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA