ARBORICULTURE

Bulletin élaboré sur la base des observations réalisées dans le cadre du réseau Provence Alpes Côte d'Azur

Bulletin également disponible sur le site : http://www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr

Bulletin de santé du végétal - PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Bulletin n° 16 / 2017
Mercredi 31 mai 2017

Pour recevoir gratuitement le BSV dès sa parution sur votre boite mail, inscrivez-vous sur www.bsv-paca.fr

Faits marquants :

Cerisier :

- **Développement végétatif** : Véraison à récolte
- ***Drosophila suzukii*** : **Risque toujours élevé**, rester vigilant
- **Mouche de la cerise** : Fin du vol dans la plupart des zones

COMITE DE REDACTION DE CE BULLETIN :

Animatrice Filière Pomme/Poire : Myriam BERUD (Station d'Expérimentation La Pugère)
Animatrice Filière Cerise : Clémence MAILLOT (Domaine Expérimental La Tapy)
Suppléant : Vincent RICAUD (Chambre d'Agriculture de Vaucluse)

LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS CE BULLETIN ONT ETE REALISEES PAR :

Chambres d'Agriculture de Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence, CIRAME, GRCETA Basse Durance, CETA Cavaillon, OP Vergers de Beauregard, OP Alpes Coop Fruits, SICA Pom'Alpes, Sociétés RAISON'ALPES, CAPL, ALPESUD.

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Monsieur Claude ROSSIGNOL
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Provence Alpes Côte d'Azur
Maison des Agriculteurs - 22, Avenue Henri Pontier
13626 - AIX EN PROVENCE CEDEX 1
contact@paca.chambagri.fr
tel : 04 42 17 15 00

RÉFÉRENTS FILIÈRES ET RÉDACTEURS DE CE BULLETIN
POMME-POIRE : Myriam BERUD - tel : 04 90 59 29 00
Station d'Expérimentation La Pugère - m.berud@lapugere.com
CERISE : Clémence MAILLOT - tel : 04 90 62 69 34
Domaine Expérimental La Tapy - cmaillot@domainelatapy.com

CERISIER

Bulletin n° 16 / 2017
Mercredi 31 mai 2017

Secteur Basse Durance - Ventoux :

✦ DEVELOPPEMENT VEGETATIF

Mi-véraison

Maturité

Stades véraison à récolte, selon les variétés et les zones géographiques.

VARIETES	Folfer	Summit	Belge
STADE PHENO.	Fin de récolte	Début de récolte	Couleur 1-2

✦ *DROSOPHILA SUZUKII*

SITUATION ACTUELLE :

Dans l'ensemble, les vols restent faibles cette semaine mais cela s'explique notamment par l'augmentation de l'attractivité des cerises en cours de maturité par rapport aux pièges et par les conditions climatiques de ces derniers jours (temps sec et chaud). Le piégeage ne reflète donc pas forcément les niveaux de population présents.



Nombre de *D. suzukii* capturées dans différentes parcelles du secteur depuis le 15 Avril 2017

CERISIER

Bulletin n° 16 / 2017
Mercredi 31 Mai 2017

Pour le moment, des dégâts sont observés sur des vergers non ou peu traités. Quelques retours commerciaux de lots sont signalés. Le suivi des piqûres d'une parcelle de Summit non traitée montre que plus de 80% des fruits sont piqués.

Quelques cas de parcelles théoriquement bien protégées qui décrochent ont également été signalés.

Estimation du risque :

Le risque d'attaque demeure à un niveau élevé, en raison de la capacité de reproduction très rapide de l'insecte.
La situation pourrait encore s'aggraver à partir du 12-14 juin environ si les conditions sont humides et tempérées (nouvelle génération attendue).Toutes les variétés sont concernées par ce risque. **Il est nécessaire de rester très vigilant.**

✦ MOUCHE DE LA CERISE

SITUATION ACTUELLE

Fin du vol sur les zones précoces et médianes.

Estimation du risque :

Les premières pontes de la mouche ont lieu en théorie 7 à 10 jours après l'émergence de l'adulte. La mouche pond préférentiellement sur fruits en cours de véraison ; les larves éclosent environ une semaine après la ponte. Elles sont toujours en cours.

✦ MONILIOSES DES FRUITS

SITUATION ACTUELLE

Rien à signaler sur les parcelles du réseau.

Estimation du risque :

La cerise est sensible aux monilioses des fruits de la véraison à la récolte. La contamination a lieu si les conditions climatiques sont favorables à la germination des spores du champignon (pluies, humectation longue, absence de vent), si des blessures existent sur le fruit (éclatement, piqures d'insectes, microfissures, …) et en fonction du stock de conidies présent dans le verger.

✦ CYLINDROSPORIOSE

SITUATION ACTUELLE

Les parcelles du réseau touchées ne montre pas d'évolution, la situation est stabilisée.

N.B. Ce Bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre régionale d'Agriculture et l'ensemble des partenaires du BSV dégagent toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie, le cas échéant, sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.