

Fraternité



PESTE PORCINE AFRICAINE ITALIE / PIEMONT-LIGURIE

CROPSAV PACA 21/01/2022

G GERBIER, Personne ressource nationale PPA





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE




Il était une fois en Géorgie (juin 2007)














Faits majeurs

2007 : Géorgie

2014 : Entrée dans l'UE

06/2017 : Tchéquie

(éradication)

09/2018 : Belgique

(éradication)

09/2018: Chine

09/2020 : Allemagne

07/2021: Rep

dominicaine

01/2022 : Italie,

Macédoine du Nord



Depuis 2014, deux situations (au 21/01/2022)

- Propagation par voisinage
 - Pologne, Lituanie, Lettonie,Estonie (2014)
 - Roumanie
 - Bulgarie (2018)
 - Slovaquie, Serbie (2019)
 - Laos, Cambodge, Vietnam,
 Mongolie, Corée du Nord, Corée du Sud, Birmanie, Philippines,
 Indonésie (2019)
 - Allemagne (2020)
 - Macédoine du Nord (2022)

- Propagation longue distance
 - Sardaigne (depuis 1978)
 - Tchéquie (2017)
 - Belgique (2018)
 - Hongrie (2018)
 - Chine (2018)
 - République dominicaine (2021)
 - Italie (2022)




Situation au 17/01/2022

- 14 sangliers infectés
- Génotype II isolé
- Origine
 - Hypothèse : sandwich jeté près de l'Autoroute A7


Zone infectée mise en place et déjà étendue à 114 communes (Décision d'exécution 2022/62 14/01/2022)

 Conclusion : détection tardive (2 mois de retard si on considère la vitesse de propagation moyenne chez le sanglier)






Elevages porcins dans la zone





Risque pour la France



- Points négatifs
 - Risque de diffusion important
 - Persistance : au moins 2 ans dans le scénario favorable
- Points positifs
 - Pas de foyer en élevage
 - Cas situés au nord des reliefs ligures
 - Effet barrière des Alpes
 - Peu de mouvements de sanglier en saison hivernale



Surveillance faune sauvage



	Modalité de surveillance	Niveau 1	Niveau 2a	Niveau 2b	Niveau 3
SAGIR	Fonctionnement habituel du réseau Sagir	х			
	Renforcement analyses : analyses PP sur l'ensemble des cadavres de sangliers collectés dans le cadre du réseau Sagir		X	x	X
	Renforcement de l'observation terrain en augmentant le réseau d'acteurs			x	X
	Renforcement de la collecte par les ITD Sagir et possibilité de prélèvements terrain pour éviter tout transport de cadavre			x	X
	Prélèvements terrain sur tous les cadavres de sangliers (y compris bord de route)				x
	Recherche active de cadavres de sangliers par des agents ONCFS / chasseurs spécifiquement formés				x
EXAMEN DE CARCASSES	Examen de carcasses dans le cadre de la pratique habituelle de la chasse			X	X


NB: Pour les zones de niveau 4, les modalités de surveillance sont définies dans la note de service DGAL/SDSPA/2017-727 du 04/09/2017.

Passage en 2B des départements 04, 05,06

- Groupe de suivi PTF ESA réuni le 13/01
- Points discutés
 - Phasage des actions
 - Inclusion ou non des bords de route dans les collectes et analyses
 - Levée des filtres du signalement et de la collecte au sein du réseau Sagir
 - Augmentation et diversification du nombre d'observateurs terrain
 - Augmentation du nombre de collecteurs/préleveurs pour tendre vers un maillage territorial satisfaisant

Point à approfondir : corridors écologiques entre France et Italie








Liberté Égalité Fraternité


RETOUR D EXPERIENCE PPA BELGIQUE 2018-2021








Dernier cadavre frais viropositif Ossements viropositifs datant de plusieurs mois





Chronologie 2018





Recherche et collecte des cadavres

Permet de délimiter la zone infectée



Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement



Clôtures




















Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement



Dépeuplement des sangliers











Biosécurité en forêt









+ Formation







Nettes en solometorement les 4 nettes avec le shemostre avent de modles le citen dons le coffie Holge en respectant les reconstructions. d'utilisation des produit. Descripte de procédure avec Descon Pyu © : Utilisette des gants.

28 describes l'extrémité de la parte avec de l'eux shoude
3. Appliques le shampaning et movous paux le réjustis (insistes en les airaodnos).

6/Socher les pattes avec une serviette groupe que vous placez ensent de sac porhelle 5/Penser à donnéeser le matériel utilisé (bassau, laisse, cellier, etc.)

100/30/30 550/2000 of



Tout or qui a dé en contact avec la cadavre et ses jus (environnement, cuils, véerments et EP)
 Gourt és vélécules à distance des cadavres (minimum 100 m et vi possible pas sur des chemins de terre)
 On liente au maximum les contacts avec co qui est contaminé
 On sépare or qui est propre et ce qui est contaminé
 Les benantes déclinées avec au l'autre qui est contaminé

Implicat d'édite tout contact avec des aiminus denentiques sensities pendant au mais 489.

Youns deven literarier labor que voir n'avec n'obssissire per de rechange, n'a bleu de traviali, pas de panique, vous pouvet traveiller proponement avec les moyens de bond :

Les cetts, voir \$4000 en un victor lessisis séries de d'éditiones mour les foires través.

Use posta des areas control fair foste prima proces interações posta estando aposta estando por la composição de la boriga dela boriga de la boriga del la boriga de la boriga del la boriga del

Prégarer une aduttion désidénéctante (dilution) dans un pubeirsateur (qui sera prêt à l'emploi)
 Organiser la volture avec, zone propre = sièges /zone sale = coffre
 Arrollé aux le site de la montalité.

 à distance de la zone de mortalifié, et des zones potentiellement souilées.
 disposer d'un emplacement suffisant pour les manips de préparation de madriel et revêtement des EPI / sécurité routi Préparer le matériel qui reste dans le véhicule :

la glacière - l'ouvrir ovant
 matérial pour la lavage et la désinfection des mains
Coller les étiquettes de la fiche SAGIR sur tube et écouvillers

Préparer le matérisi que vous arrenze pois du cedeves (minimum 15 mictres):

un se pois matérisi douté es (statals, entrouser l'ouverturé A

matérisi de prélèvement : écouvillons, coalpel jetable ou couteau dédié aux cedavres, tube ou saichet pour la foullé matérisi de prélèvement ne (MP roppe les garde).

DASRI / Appareil pheto ou urmartiphone dans siglack i e mettere en teruse (noi fi la vicibure soit à l'abond du cadaver – fonction de la distance à parcourir) agrade les vietnements difficiement décressires : enlevez le surplus de vétements (puil, étc.) et les mettre en zone propre

n gant en lates. Mr Sale met um masque -f- lanestes (pour les projections)

band de la mantallité: accès au cadavre par la zone la moiss soulible possible (attention au jus d'écoulement etc)



s gants en place préféversents)

i C puis ferme ce Referme l'écouvillon puis l'écouvillon petre le scalpel dans poubelle jaune (DASE)





MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGRICULTURE DE L'AGRICULTURE SAUVage







Surveillance SAGIR Renforcé PPA - 16/09/18 au 30/11/2018/18







Recherche active des cadavres



Patrouilles de chasseurs

Carte des données de surveillance cumulées semaine 28 à 31

Ratissage





Prospection canine











Conclusions

- Maladie complexe à gérer
- Expérience acquise depuis 2014 mais nécessité d'adapter à chaque situation
- Importance de la détection précoce pour garder une possibilité d'éradication
- Impact majeur sur la chasse, l'élevage porcin, les activités en nature

Point positif : plus temps pour se préparer et anticiper que pour la PPA en Belgique



Merci pour votre attention

