

PAPAM

PACA

N° 4
11 avril 2025



Référent filière & rédacteurs

Quentin RUBY
CRIEPPAM

quentin.ruby@crieppam.fr

Stéphanie TAQUIN
CRIEPPAM

stephanie.taquin@crieppam.fr

Directrice de publication

Georgia Lambertin
Présidente de la chambre régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte
d'Azur

Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service régional de l'Alimentation
PACA

132 boulevard de Paris
13000 Marseille



AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Stade végétatif

Les lavanderaies sont en début de reprise.

Cochenilles

- **Observations** : cochenilles observées sur le secteur d'Apt sur lavandin.
- **Niveau de risque** : risque modéré à fort.

Arima marginata

- **Observations** : larves d'*Arima marginata* observées sur thym et lavandin.
- **Niveau de risque** : risque modéré.



[Vous abonner](#)



[Devenir observateur & contact](#)



[Tous les BSV PACA](#)

Cochenille du lavandin

Reconnaissance et méthode d'observation → [en ligne sur le site du CRIEPPAM](#)

Résultats des observations

Des cochenilles sont observées sur lavandin à Apt (04).

Seuil de nuisibilité


Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur.

Gestion du risque

Surveiller particulièrement l'apparition de crispation du feuillage sur les parcelles ayant déjà présenté ces symptômes antérieurement.

Analyse de risque

Les températures actuelles contribuent à la présence de ce ravageur sur les parcelles sensibles et à **redémarrage précoce**. Il faut **renforcer les observations** sur celles **atteintes l'an dernier** ou il y a **deux ans**.



Arima marginata

Reconnaissance et méthode d'observation → [en ligne sur le site du CRIEPPAM](#)

Résultats des observations

Des larves d'*Arima marginata* sont observées sur lavandin sur les principaux bassins de production.

Seuil de nuisibilité


3 larves par plante ou 5 à 6 larves par m².

Gestion du risque

- Surveiller les parcelles et particulièrement celles atteintes l'an dernier,
- Repérer la présence de nouveaux foyers,
- Surveiller l'apparition prochaine des larves et des dégâts occasionnés.

Analyse de risque

Les températures actuelles contribuent à la présence de ce ravageur sur les parcelles sensibles et au **redémarrage précoce**. Il faut **renforcer les observations** sur celles **atteintes l'an dernier** ou il y a **deux ans**.



Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

CRIEPPAM - Quentin RUBY
CRIEPPAM – Stéphanie TAQUIN
CRIEPPAM – Noémie LAVERGNE



Observations

CRIEPPAM
Iteipmai
Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute Provence
Chambre d'Agriculture du Vaucluse
Chambre d'Agriculture de la Drôme



Financements



Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.



[Vous abonner](#)



[Devenir observateur & contact](#)



[Tous les BSV PACA](#)