PAPAM

PACA

N° 5
15 mai 2025

Référent filière & rédacteurs

Quentin RUBY
CRIEPPAM
quentin.ruby@crieppam.fr

Stéphanie TAQUIN
CRIEPPAM
stephanie.taquin@crieppam.fr

Directrice de publication

Georgia Lambertin
Présidente de la chambre régionale d'Agriculture Provence Alpes-Côte d'Azur
Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service régional de l'Alimentation PACA
132 boulevard de Paris
13000 Marseille

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Stade végétatif

Les lavanderaies sont au stade élongation de la hampe florale (supérieure à 10 cm dans les zones précoces).

Chenilles de tordeuse

- **Observations :** dégâts de chenilles de **tordeuses** observés sur lavande et lavandin dans les secteurs de Revest du Bion, Aubenas les Alpes ainsi que la Drôme.

- **Niveau de risque :** risque **fort**.

Cochenilles

- **Observations :** cochenilles observées sur lavandin sur le plateau de Valensole.

- **Niveau de risque :** risque modéré à fort.

AMV

- **Observations :** présence d'AMV et de chloroses sur le plateau de Valensole.

- **Niveau de risque :** faible.

Dégats de chenilles de tordeuse

Reconnaissance et méthode d'observation → en ligne sur le site du CRIEPPAM

Observations

Des **chenilles tordeuses** sont observées sur lavande et lavandin dans les secteurs de Revest du Bion, Aubenas les Alpes ainsi que la Drôme. Selon leur localisation, les infestations actuelles peuvent dépasser les 2-3 chenilles par plant.

Les chenilles de tordeuses sont vertes avec, parfois, une tête noire et forment un cocon au niveau des jeunes feuilles en les rassemblant autour d'elles.

Analyse de risque

Les températures actuelles contribuent à l'émergence de nombreux ravageurs en lavandiculture.
Observez les populations de chenilles prioritairement sur les bordures de parcelles et celles à développement précoce. Les dégâts potentiels sont comparables à ceux de tout ravageur phytophage (feuilles dévorées, tiges sectionnées). Toutes les zones sont potentiellement concernées.



Seuil de risque

2 - 3 chenilles / plante ou m²

Gestion du risque

Surveiller les parcelles atteintes l'an dernier, repérer la présence de nouveaux foyers, surveiller l'apparition prochaine des larves et des dégâts occasionnés.
Pour limiter l'impact du ravageur, il est possible d'utiliser de la *Bacillus thuringiensis* (solution de biocontrôle) en alternative aux produits phytopharmaceutiques de synthèse

B Liste des produits de biocontrôle

Cochenille du lavandin

SOMMAIRE

Reconnaissance et méthode d'observation → en ligne sur le site du CRIEPPAM

Résultats des observations

Des cochenilles sont observées en parcelles de lavandin sur le plateau de Valensole (04).

Seuil de nuisibilité

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur.

Gestion du risque

Surveiller particulièrement l'apparition de crispation du feuillage sur les parcelles présentant déjà ces symptômes antérieurement, et tous secteurs confondus.

Analyse de risque

Les conditions météorologiques actuelles contribuent à la présence de ce ravageur sur les parcelles sensibles**.** Il faut **renforcer les observations** sur celles **atteintes** l'**an dernier** ou il y a **deux ans.**



Jaunissement des parcelles

Le risque de confondre les symptômes d'AMV et de chloroses sont forts. Il est donc important de bien observer les plants pour identifier l'origine des symptômes. **Reconnaissance de l'AMV** **en ligne.**

AMV : virus de la mosaïque de la luzerne

SYMPTÔMES

Une des réactions caractéristiques à l'AMV (Alfalfa mosaic virus) est l'apparition d'une panachure de bandes jaune citron sur feuilles et tiges.

MOYENS DE LUTTE

Il n'existe aucun de moyen de lutte directe. L'unique solution est l'implantation de plants certifiés indemnes de maladie.

CAUSES

La contamination par l'Amv dans les parcelles se fait essentiellement lors de prélèvements de boutures sur des plants atteints. La contamination entre plants par des insectes (pucerons) ou par voie mécanique est moins significative.

CHLOROSE FERRIQUE

SYMPTÔMES

La chlorose ferrique se traduit par un feuillage anormalement jaune, les nervures principales restant plus ou moins vertes. Le jaunissement s'observe sur les jeunes feuilles.
C'est une carence entrainant un ralentissement de la croissance des plants et pouvant aboutir à la mort des plantes dans les cas extrêmes

CAUSES

Les sols riches en calcaires actifs sont très sensibles à ce phénomène. La succession de pluies et de sècheresse, ou une longue période pluvieuse, est favorable à l'expression des symptômes.

Observation d'avril 2023

Des symptômes d'AMV et de chlorose ferrique ont été observés sur le plateau de Valensole.

Analyse de risque



Avertissement

SOMMAIRE

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

CRIEPPAM - Quentin RUBY
CRIEPPAM – Stéphanie TAQUIN
CRIEPPAM – Noémie LAVERGNE

Observations

CRIEPPAM
Iteipmai
Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute Provence
Chambre d'Agriculture du Vaucluse
Chambre d'Agriculture de la Drôme

Financements

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.

Vous abonner | Devenir observateur & contact | Tous les BSV PACA