

Tomate d'industrie

PACA

n°5
05 décembre 2025



Référent filière & rédacteur

Robert GIOVINAZZO
SONITO
rgiovinazzo@sonito.fr

Camille BOUDOT
SONITO
cboudot.sonito@gmail.com

Directeur de publication

Georgia LAMBERTIN
Présidente de la chambre régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte
d'Azur
Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service régional de l'Alimentation
PACA
132 boulevard de Paris
13000 Marseille



AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Réseau d'épidémiosurveillance

Bilan climatique 2025

Pression biotique 2025

Bilan par bioagresseur



Vous abonner |



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA


Réseau d'épidémiosurveillance

Le réseau couvre les secteurs de production des 3 régions, Occitanie, Sud PACA et Auvergne-Rhône Alpes avec 3 parcelles flottantes représentatives (1 à Marsanne, 1 en Camargue et 1 à Valréas) et une parcelle de référence à Orange (84).

Type de parcelle	Département	Trapview	Cap2020	Non connectés
Référence	Vaucluse (84)			1 Orange
Flottante représentative	Drôme (26)			1 Marsanne
	Vaucluse (84)			1 Valréas
	Camargue (13)			1 Arles
Flottante	Drôme (26)	1 Marsanne	1 Roman sur Isère	
	Vaucluse (84)		1 Orange	1 Cheval-Blanc
	Camargue (13)	1 Fontvieille	1 Arles	1 Arles

Bilan climatique 2025

Printemps froid et humide : la saison a débuté avec un printemps froid et humide avec de forts cumuls de pluies qui ont empêchés les chantiers de plantation et pénalisé la reprise de certaines parcelles. Le reste de la saison a été marqué par 2 pics de stress thermique et des épisodes de pluies très abondants comme en août et septembre où les précipitations ont dépassé 100mm en quelques heures. En 2025, le cumul de pluie est de 737 mm pour la station d'Orange.



Sur ces 2 graphiques, sont représentées les pluies (histogrammes) et les températures décadaires (courbes) de l'année 2025, comparées à la normale (moyenne sur 30 ans).

Pression biotique 2025

Les adventices

Parasites	Fréquence de parcelles touchées (0-1-2-3)	Intensité sur parcelles avec présence (0-1-2-3)	Comparaison années précédentes (< , =, >)			Evolution du parasite	Avis général sur la réussite de la protection par rapport à la pression phytosanitaire	Remarques
			2024	2023	2022			
MORELLE NOIRE	3	3	=	=	=	TOUJOURS PRESENTE	Le désherbage que nous appliquons ne suffit pas. Il nous manque au minimum la métribuzine que nous utilisons en cours de culture auparavant (synergie avec rimsulfuron), voire mieux, un autre herbicide de pré-plantation plus sélectif des tomates. En 2026, il ne restera plus que la pendiméthaline et le rimsulfuron pour lutter contre les dicotylédones... Sauf à obtenir une dérogation.	Nous essayons d'autres systèmes de culture incluant du paillage biodégradable mais à un coût prohibitif pour le moment, et le binage robotisé... PARSADA 1er DECCLIC
Datura, chénopodes, amaranthes et Renouées	2 à 3	2 à 3	=	=	=	TOUJOURS PRESENTS	Le désherbage que nous appliquons ne suffit pas. Il nous manque au minimum la métribuzine que nous utilisons en cours de culture auparavant (synergie avec rimsulfuron), voire mieux, un autre herbicide de pré-plantation plus sélectif des tomates. En 2026, il ne restera plus que la pendiméthaline et le rimsulfuron pour lutter contre les dicotylédones... Sauf à obtenir une dérogation.	
Cyperus rotundus	1	1 à 2	>	>	>	EN AUGMENTATION DANS LES PARCELLES, NOTAMMENT EN CAMARGUE.	Légère efficacité du rimsulfuron	
Ambroisie	1 à 2	1 à 2	=	=	=	Drôme et Isère	Racer était efficace en pré-plantation. Quid depuis son retrait...	

Les maladies

Parasites	Fréquence de parcelles touchées (0-1-2-3)	Intensité sur parcelles avec présence (0-1-2-3)	Comparaison années précédentes (< , =, >)			Evolution du parasite	Avis général sur la réussite de la protection par rapport à la pression phytosanitaire
			2024	2023	2022		
Mildiou	1 à 2	2	<	<	<	Présent uniquement en Camargue au début du printemps	
Alternariose	2	2 à 3	=	=	=	Plutôt Drôme	
Pourriture des fruits	3	2 à 3	>	>	>	En augmentation du fait de la climatologie de fin de campagne	
Oïdium	1	2	=	=	=	En augmentation depuis quelques années. Présent dès la mi-août alors que d'habitude visible plutôt courant septembre...localisé sur la Camargue	
Sclérotinia	1	1	=	=	=	Rare dans cette région, au contraire de la région SO où il est très présent avec les nombreuses cultures de légumes d'industrie favorables à son développement. Ici, présent derrière le tournesol.	
Botrytis	2	1	=	=	=	Présent en fin de saison sous les grosses végétations.	
Cladosporiose	1	1	<	<	<		
Champignons telluriques	1	2	=	=	>	Augmentation de la fatigue des sols sur le Tarasconais et la Drôme. Parcelles des producteurs historiques.	
STOLBUR	2 à 3	2 à 3	=	=	>	Cette maladie transmise par la cicadelle <i>Hyalestes obsoletus</i> est en augmentation régulière depuis que nous régulons spécifiquement les noctuelles.	Il n'y a pas jusque là de prise de conscience pour traiter le vecteur sachant qu'il est difficile de juger le vol.

Pression biotique 2025

Les ravageurs

Parasites	Fréquence de parcelles touchées (0-1-2-3)	Intensité sur parcelles avec présence (0-1-2-3)	Comparaison années précédentes (< , =, >)			Evolution du parasite	Avis général sur la réussite de la protection par rapport à la pression phytosanitaire	Remarques
			2024	2023	2022			
Taupins	1 à 2	2	=	=	=	Nous avons une impression d'une augmentation au fil des ans. Il y a de rares destructions de parcelles, mais surtout de grosses zones où les plantes sont bloquées, mortes...Des plantes peuvent aussi survivre mais sont décalées dans le temps, "dégroupées" en maturité et avec un rendement moindre.		Ils attaquent aussi très fortement les gaines de goutte à goutte lorsqu'ils sont présents. Cela engendre de nombreuses fuites et donc l'apparition de zones humides où les maladies se propagent plus facilement.
Vers gris	1	1	=	=	=			
Pucerons	2 à 3	2 à 3	>	>	>	Augmentation de présence de pucerons.	La protection peu usuelle d'habitude a du coup été rendue délicate...	
Acariens	2 à 3	2 à 3	>	>	>	Présence de plus d'acariens et acariose depuis 3 ans. Le climat y est pour beaucoup...		
Chenilles défoliatrices	2	1 à 2	=	=	=			
Thrips	1 à 2	2 à 3	=	=	=		Nous nous sommes orientés vers des variétés résistantes au TSWV.	
Hélicoverpa a.	2 à 3	2 à 3	<	<	<	Attaques inférieures aux années précédentes.	Retour d'Altacor	Il faut caler un programme adéquat en fonction de la deuxième génération, la plus importante. Mais quid de ce programme si la première génération est finalement plus importante que prévu.
Tuta absoluta	1	1	=	=	=	Nous n'avons pas l'impression d'observer une augmentation significative des dégâts d'année en année... Seules des parcelles moins protégées contre Helicoverpa peuvent présenter des dégâts.		Il faut garder un traitement adéquat de fin de cycle de la tomate à l'avenir, en fonction de la présence des larves.
Doryphore	1	1	=	=	=			
Aleurodes	1	1	<	<	<			
Punaises	2 à 3	2 à 3	>	>	>	En augmentation. Devient un ravageur important pour la qualité des fruits.		
Mineuses	1	0						
Cochenilles	0	0						
Pyrale	0	0						
drosophyla s.	0	0						
Nématodes	1	0				SEULEMENT DANS LES SABLES D'AIGUES-MORTES	Protection par variétés résistantes.	

Bilan par bioagresseur

Adventices : Présence généralisée dans les zones de parcelles sous l'influence de l'irrigation (goutte à goutte ou aspersion). D'importantes levées à la suite des nombreuses précipitations.

Maladies :

- **Mildiou** : Peu de parcelles attaquées cette année.
- **Alternariose** : Surtout présente comme agent de pourriture de fruits en fin de saison à la suite des épisodes de pluies, mais aussi sur végétation dans l'Hérault au cours de l'été
- **Bactériose** : Dans tous les secteurs à la suite des orages.

Ravageurs :

- **Taupins** : Les taupins ont été présents dans toutes les zones de productions du Sud-Est. Les dégâts causés sont localisés et toutes les parcelles n'ont pas été attaquées.
- **Noctuelles terricoles** : Observation de quelques noctuelles terricoles avec dégâts très localisés.
- **Pucerons et thrips** : Des colonies se sont fortement développées mais sans incidence particulière sur la culture. Leur propagation a malgré tout été surveillée de près car ces derniers peuvent être vecteurs de virus.
- ***Helicoverpa armigera*** : La pression et les dégâts de noctuelles ont été moindres par rapport à l'année passée. Cependant, les vols étaient importants, notamment dans un secteur de la Drôme.
- **Punaises** : De plus en plus de punaises observées dans les parcelles. Les fruits piqués n'ont pas d'incidence sur le rendement et la qualité. A surveiller.
- **Acariens et Acariose bronzée** : Ce sont les bioagresseurs qui ont eu le plus d'incidence en 2025. Dans les 2 cas, la végétation a rapidement été grillée et cela a pu entraîner une maturation plus rapide des fruits, voire une surmaturation. Les 2 épisodes de stress thermique de juin et août en sont certainement la cause...

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

Sonito – BOUDOT Camille

Observation

Apto-2
CAPL
Perret
Panier Provençal
SCAD CANA
Sonito
Valsoleil

Financement

Action pilotée par les Ministères chargés de l'Agriculture et de la Transition Écologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA