



Viticulture

PACA

n°13
9 juin 2026



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Référent filière & rédacteurs

Pauline VEZIN

Chambre d'Agriculture de Vaucluse
pauline.vezin@vaucluse.chambagri.fr

Directeur de publication

Georgia LAMBERTIN

Présidente de la Chambre Régionale
d'Agriculture Provence Alpes-Côte
d'Azur

Maison des agriculteurs
22 Avenue Henri Pontier
13626 Aix en Provence cedex 1
contact@paca.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

**Service Régional de l'Alimentation
PACA**

132 boulevard de Paris
13000 Marseille

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Phénologie

Grenache : une semaine à 10 jours d'avance sur 2025

Maladies

Mildiou : peu de nouvelles taches sur feuilles

Oïdium : risque fort jusqu'à fermeture de la grappe

Black rot : peu d'évolution

Flavescence dorée : T1 du 1^{er} au 12 juin pour les zones à 2, à 3 traitements et vignes mères

Ravageurs

Vers de la grappe : premières pontes sur secteur précoce et début du vol en secteur tardif

Pyrale du Daphné : peu de piégeages

Annexe

OAD DAC ADN

Réglementaire

Note technique nationale sur les résistances de la vigne

Note réglementation protection des abeilles

Liste Produits de Biocontrôle

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo 

Notes nationales

Biodiversité

Note technique nationale OSCAR 2026

A surveiller

Ambroisie

Datura Stramoine

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

 **GOUVERNEMENT**

Liberté
Égalité
Fraternité



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

La stratégie
écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA



Stade K :
baies 7-9 mm



Stade K : baies à
taille de pois
5-7 mm



Stade J : baies à taille
de grains de plomb
2-3 mm



Stade J :
Nouaison

Photos CA84

Grenache

Secteur 0	Secteur I	Secteur II	Secteur III	Secteur IV	Secteur V
Stade B8 à L (fermeture de la grappe)	Stade B6 à L	Stade B4 à L	Stade B4 à B8	Stade B2 à B7	Stade J (nouaison) à B4
B12 (10-12 mm) majoritaire	B10 (9-10 mm) Majoritaire	B8 (8-9 mm) majoritaire	B6 (6-7 mm) majoritaire	B4 (4-5 mm) majoritaire	B2 (2-3 mm) majoritaire

Carte de précocité

Au 18 mai, les stades phénologiques observés montrent en moyenne une semaine à 10 jours d'avance par rapport à 2025.

Des premiers arrêts de croissance ont été observés dans le Var, ainsi que des premiers ralentissements dans le Cavalon.


De la coulure est observée dans le Var et le sud Luberon, parfois à forte intensité sur certains cépages.

Des dégâts de grêle ont été constatés dans le Calavon.


Données de la modélisation

Les courbes sont réalisées avec les sommes de températures base 5°C à partir du 1^{er} janvier puis avec des températures 10°C au-delà de 321°C (seuil débourrement grenache). Ce calcul est issu des travaux de Iñaki Garcia de Cortazar (INRAe, Avignon) pour modéliser les stades phénologiques de la vigne.

VAUCLUSE




BOUCHES DU RHÔNE



VAR

HYERES SCRADH


Suivi et comparaison des sommes de températures base 5°C / 10°C



HAUTES-ALPES

REMOLLON

Suivi et comparaison des sommes de températures base 5°C / 10°C



Maladies

MILDIOU

Biologie : [Cf. bulletin n°9](#)

Tache de mildiou sur feuille



Tache de mildiou et Rot Brun sur grappe




Photos CA84/CA26

Données de la modélisation

Analyse de risque : OAD DAC ADN mildiou

Cette année, un capteur de spore a été installé dans plusieurs départements (Bouches du Rhône, Var et Vaucluse). Pour plus d'informations sur le modèle, cliquer [ici](#) pour vous consulter l'annexe OAD DAC ADN (Cf. BSV n°9).



Stade phénologique :

Considéré comme sensible.

Facteur Météo d'Infection :

Plusieurs périodes propices à l'infection : 1 heure le 02/06 ; 5 heures du 04 au 05/06 ; 1 heure le 07/06.

Sporée aérienne *P. viticola* :


Aucune sporée aérienne n'a été détectée sur la parcelle pour l'échantillon du 04/06.

Risque épidémique :

Avec un stade phénologique sensible et des conditions peu propices, le risque reste à 2 sur la semaine à venir.

MILDIOU (suite)

Analyse de risque : OAD DAC ADN mildiou (suite)



Stade phénologique :
Considéré comme sensible.

Facteur Météo d'Infection :
Plusieurs périodes propices à l'infection :
19 heures du 31/05 au 02/06 ;
1 heure le 04/06 ;
4 heures le 08/06.

Sporée aérienne *P. viticola* :
Aucune sporée aérienne n'a été détectée sur la parcelle pour l'échantillon du 04/06.

Risque épidémique :
Le risque augmente à 4 parallèlement à l'augmentation du FMI puis redescend à 2 à partir du 09/06.

Stade phénologique :
Considéré comme sensible.

Facteur Météo d'Infection :
Plusieurs périodes propices à l'infection :
3 heures le 02/06 ;
6 heures du 04 au 06/06 ;
3 heures du 08 au 09/06.

Sporée aérienne *P. viticola* :
Aucune sporée aérienne n'a été détectée sur la parcelle pour l'échantillon du 04/06.

Risque épidémique :
Suite à l'apparition des premiers symptômes, le risque reste à 4 jusqu'à la fin de la semaine.

Territoire Sud Drôme/Côtes du Rhône/Vallée du Rhône :

Analyse de risque : modèle DAC ADN

Les conditions météo de la semaine passée ont pu être favorables à des contaminations mildiou en raison des pluies survenues le 4 juin et des trois périodes de FMI retenues par le modèle avec d'éventuelles sorties à compter du 12 juin. Des repiquages peuvent être possibles.

Analyse de risque : modèle Milstop

Suite à l'épisode orageux du 4 juin, le modèle Milstop enregistre de potentielles contaminations avec un risque faible à modéré sur l'ensemble du territoire. Les sorties pourraient être visibles à compter du 12 juin.

Observations

Quelques nouvelles taches sur feuille sont observées en tous secteurs du Vaucluse. Peu d'évolution depuis la semaine passée sur le territoire Sud Drôme/Vaucluse.


MILDIOU (suite)

Observations


Sur 44 parcelles observées du 2 au 9 juin, 2 parcelles présentent des symptômes sur feuille.

Mildiou sur feuilles : fréquence et intensité

2026



2025 (BSV n°13, 2025)



Parcelles natures: sur 8 parcelles suivies, 5 parcelles présentent des symptômes sur feuille avec moins d'une tache par cep.

Estimation du risque

Cas général :



En cas d'orages/pluies annoncées



Territoire Provence (Var) :

Analyse de risque : modèle DAC ADN

Le modèle DAC ADN enregistre plusieurs périodes propices à des contaminations la semaine passée avec de potentielles sorties visibles d'ici la fin de semaine à semaine prochaine.

Analyse de risque : modèle Milstop

Le modèle Milstop enregistre un risque faible avec de potentiels repiquages suite aux conditions météo de la semaine passée.

Observations

Des symptômes sont toujours visibles sur feuille et sur grappe, peu d'évolution à ce jour.


MILDIOU (suite)

Observations


Sur 27 parcelles observées du 2 au 9 juin, 4 parcelles présentent des symptômes sur feuille.

Mildiou sur feuilles : fréquence et intensité

2026



2025 (BSV n°13, 2025)



Parcelles natures: sur 3 parcelles observées, aucun symptôme n'a été observé.

Estimation du risque

Cas général :



En cas d'orages/pluies annoncées et fortes rosées, particulièrement sur jeunes feuilles et sur grappes.



Territoire Bouches du Rhône/Sainte Victoire/Sud Luberon :

Analyse de risque : modèle DAC ADN

Le modèle DAC ADN enregistre un risque fort début de semaine passée sur la station de Lambesc (13), puis en baisse. De potentielles contaminations et/ou repiquages ont pu avoir lieu.

Analyse de risque : modèle Milstop

Le modèle Milstop enregistre un risque variable selon les secteurs, de faible à fort, suite à l'épisode orageux du 4 juin. Les sorties pourraient être visibles à partir du 13 juin.

Des sorties peuvent toujours être en cours suite à l'épisode pluvieux localisé du 29 mai.

Observations

Peu d'évolution des symptômes visibles sur feuille, hormis sur une parcelle à Arles en bordure du Rhône.


MILDIOU (suite)

Observations


Sur 32 parcelles observées du 2 au 9 juin, 13 parcelles présentent des symptômes sur feuille.

Mildiou sur feuilles : fréquence et intensité

2026



2025 (BSV n°13, 2025)



Parcelles natures: sur 7 parcelles suivies, 1 parcelle présente des symptômes sur feuille (repiquages).

Estimation du risque

Cas général :



En l'absence de taches, d'orages/pluies annoncées et de fortes humidités



Territoire Hautes-Alpes :

Analyse de risque : modèle Milstop

Le modèle Milstop enregistre un risque modéré suite aux pluies du 2 et du 4 juin avec d'éventuelles sorties à compter du 12 juin. Des sorties peuvent toujours être en cours suite aux potentielles contaminations du 29 mai.

Observations

Aucun symptôme n'a été observé par le réseau BSV.

Estimation du risque

Cas général :



Si les épisodes pluvieux ont été contaminants



MILDIOU (suite)

Gestion alternative du risque

Mesures prophylactiques :

Les mesures prophylactiques désignent l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation de maladie.

Pour limiter le risque de contaminations mildiou :

- Limiter les flaques par l'enherbement.
- Supprimer les organes verts à proximité du sol (épamprage précoce et destruction des plantules).
- Gérer au mieux la vigueur par notamment le choix du porte-greffe, le raisonnement de la fertilisation et des irrigations.

- Des **produits de biocontrôle** peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte (ex: phosphonate de potassium, disodium phosphonate...) . La liste des biocontrôles est disponible [ici](#)

B

- Choisir des cépages ou variétés en fonction de leur niveau de sensibilité ou choisir des variétés « résistantes » (vérifier l'autorisation au préalable pour les AOP et IGP, notamment des Variétés d'Intérêts à Fin d'Adaptation (VIFA)).

R

Suites à des prélèvements réalisés dans le cadre des plans de surveillance résistance, des dérives de sensibilités vis-à-vis de fongicides mildiou ont été détectés en laboratoire. Cela ne se traduit pas nécessairement par une baisse d'efficacité au vignoble, mais il convient d'être particulièrement attentif à l'efficacité des traitements appliqués.

Plus d'infos : <https://www.r4p-inra.fr>

OÏDIUM

Biologie : [Cf. bulletin n°9](#)

Oïdium sur feuille



Oïdium sur grappe



Photos CA84/CA13

Données de la modélisation

Analyse de risque : [OAD DAC ADN oïdium](#)

Cette année, un capteur de spore a été installé dans plusieurs départements (Bouches du Rhône, Var et Vaucluse). Pour plus d'informations sur le modèle, cliquer [ici](#) pour vous consulter l'annexe OAD DAC ADN (Cf. BSV n°9).


Sur les trois capteurs mis en place, le risque est généralement modéré pour la période du 2 au 9 juin.

OÏDIUM

Analyse de risque : OAD DAC ADN oïdium

Oïdium - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Lambesc (13)

BBCH 75 : Grain de pois



Stade phénologique :
Considéé comme sensible.


Facteur Météo d'Infection :
Après une période propice à l'infection, le FMI oïdium diminue fortement pendant la semaine, à partir du 09/06.

Sporée aérienne *E. necator* :
121 conidies mesurées sur l'échantillons du 04/06.

Risque épidémique :
Le risque est à 4 entre le 02 et 05/06, puis diminue à 2 graduellement, parallèlement à la chute du FMI.

Oïdium - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Roquebrune-sur-Argens (83)

BBCH 75 : Grain de pois



Stade phénologique :
Considéé comme sensible.


Facteur Météo d'Infection :
12 heures de FMI le 07/06, puis les conditions sont moins propices le reste de la semaine, jusqu'au 16/06.

Sporée aérienne *E. necator* :
Aucune sporée aérienne n'a été détectée sur la parcelle.

Risque épidémique :
Le risque augmente graduellement de 2 à 3 parallèlement à l'augmentation du FMI du 31/05 au 08/06, puis diminue graduellement à 2 durant la semaine avec la diminution du FMI.

Oïdium - suivi des paramètres épidémiques - 2026 - Piolenc (84)

BBCH 73 : Grain de plomb



Stade phénologique :
Considéé comme sensible.

Facteur Météo d'Infection :
Après une période propice à l'infection, le FMI oïdium diminue fortement pendant la semaine, à partir du 09/06.

Sporée aérienne *E. necator* :
6 conidies mesurées sur l'échantillons du 04/06.

Risque épidémique :
Le risque est monté à 3 à partir du 28/05, puis à 4 entre le 04 et 06/06. Il diminue par la suite avec la diminution du FMI, pour atteindre le niveau 2 à partir du 11/06.

— FMI Mildiou (heure) — Log(qté sporange) — Risque Mildiou



OÏDIUM (suite)

Observations

Rares symptômes sur grappe dans le Vaucluse/sud Drôme. Quelques évolutions sur grappes sur cépages sensibles dans les Bouches du Rhône.

Sur 92 parcelles observées du 2 au 9 juin, 10 parcelles présentent des symptômes sur feuille (majoritairement entre 1 à 10 feuilles oïdiées sur 100 ceps) et 5 parcelles ont des symptômes sur grappe (majoritairement entre 1 à 10 grappes touchées pour 100 grappes).

Parcelles natures: sur 18 parcelles suivies, 8 parcelles présentent des symptômes sur feuille (Vaucluse, Var et Bouches-du-Rhône) dont 4 sur grappe (Bouches-du-Rhône).

Analyse de risque

Cas général :



Jusqu'à fermeture de la grappe



Gestion alternative du risque

Mesures prophylactiques

- Choisir des cépages ou variétés en fonction de leur niveau de sensibilité ou choisir des variétés « résistantes » (vérifier l'autorisation au préalable pour les AOP et IGP, notamment des Variétés d'Intérêts à Fin d'Adaptation (VIFA)).
- Favoriser l'insolation et l'aération des grappes par l'ébourgeonnage, l'effeuillage, le palissage. L'oïdium est sensible aux UV.

Techniques alternatives :

B Des **produits de biocontrôle** peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte (ex: soufre, bicarbonate de potassium...). La liste des biocontrôles est disponible [ici](#)

R Suites à des prélèvements réalisés dans le cadre des plans de surveillance résistance, des dérives de sensibilités vis-à-vis de fongicides oïdium ont été détectés en laboratoire. Cela ne se traduit pas nécessairement par une baisse d'efficacité au vignoble, mais il convient d'être particulièrement attentif à l'efficacité des traitements appliqués.

Plus d'infos : <https://www.r4p-inra.fr>

BLACK ROT

Biologie

Le Black-rot est une maladie provoquée par un champignon : *guignardia bidwellii*. Il hiverne sous forme de périthèces sur les organes touchés par la maladie. Au printemps, ces périthèces libèrent des ascospores suite à une pluie. Les premières contaminations sont possibles dès le stade 2-3 feuilles étalées, suite à une humectation prolongée et à une température supérieure ou égale à 9°C. Après une période d'incubation d'une vingtaine de jours, des taches apparaissent sur le feuillage. Ces taches sont plus ou moins régulières, d'environ 5 mm de diamètre. De couleur café au lait, virant au « brun feuille desséchées », elles sont bordées d'un liseré violacé. Elles se couvrent ensuite de pycnides.

Pour plus d'information, cliquer [ici](#)

Tâche de black-rot sur feuille



Source : CA84

Tâche de black-rot avec des pycnides



pycnides

Source : INRAE

Les pycnides assurent les contaminations secondaires sur feuilles et jeunes grappes. Sur les baies de l'année, on observe d'abord une petite tache circulaire, de couleur « café au lait » au contour net, qui progresse rapidement et envahit en 2 ou 3 jours la totalité du grain. La baie altérée prend une teinte marron clair, elle se flétrit et finit par se dessécher. Sa peau devient alors noire avec des reflets bleuâtres et se couvre de pycnides. Ces baies momifiées restent fortement attachées à la rafle et constituent une source d'inoculum pour l'année suivante.

La sensibilité maximale des grappes se situe entre le stade nouaison et le stade début fermeture de la grappe. Elle diminue ensuite jusqu'au stade début véraison.

Observations

Peu d'évolution de symptômes sur feuille depuis la semaine passée sur l'ensemble des territoires.

Sur 78 parcelles observées du 2 au 9 juin, 7 parcelles présentent des symptômes de black rot sur feuille dont 6 localisées dans le territoire Vaucluse/sud Drôme. Aucune parcelle ne présente de symptôme sur grappe.

Parcelles natures: sur 18 parcelles suivies, 9 parcelles présentent des symptômes sur feuille (8 parcelles territoire Vaucluse – sud Drôme et 1 dans le Var).

Analyse du risque

D'éventuelles contaminations (niveau 1) ont pu avoir lieu suite à l'épisode orageux du 4 juin avec des sorties à partir du 17 juin (modèle CA84).

BLACK ROT (suite)

Estimation du risque

Cas général :



Sensibilité accrue de la nouaison à la fermeture de la grappe



Cas particulier : parcelles à historique



Gestion alternative du risque



Aucun produit de biocontrôle peut être intégré dans la stratégie de lutte contre le Black rot.

Mesures prophylactiques :

- Eliminer les grains desséchés (momies) existant sur les souches lors de la taille.
- Arracher les vignes abandonnées.
- Effectuer un travail du sol pour enfouir après la taille les sarments atteints.

FLAVESCENCE DOREE : maladie de quarantaine

Biologie

La Flavescence dorée est une maladie due à un phytoplasme qui ne peut survivre que dans les cellules vivantes de la plante infectée ou dans l'insecte vecteur qui transmet la maladie de cep à cep. L'insecte vecteur est une cicadelle jaune : *Scaphoideus titanus*, inféodée à la vigne. Elle est reconnaissable à son abdomen triangulaire avec deux taches noires distinctes à l'extrémité. Elle hiberne sous forme d'œufs sous l'écorce des bois de deux ans. Les éclosions débutent en mai et se prolongent sur plusieurs semaines. Les larves évoluent en adultes en 40-45 jours en passant par cinq stades larvaires. Les larves se déplacent en sautant. Les premiers adultes apparaissent à partir de la mi-juillet. Il n'y a qu'une génération par an.

Les voies de contamination :

- par l'insecte vecteur, de parcelles en parcelles. Dans tous les cas, les larves de cicadelles de la Flavescence dorée naissent saines et s'infectent en piquant les ceps contaminés. La capacité d'inoculation s'acquiert après une période d'incubation d'un mois. La salive est alors infectieuse et l'insecte garde la capacité de transmission du phytoplasme jusqu'à sa mort.
- par le matériel de multiplication : la transmission de la Flavescence dorée est possible par les greffons et les porte-greffes.

FLAVESCENCE DOREE : (suite)

Biologie

Les symptômes :

- feuilles cassantes qui s'enroulent plus ou moins en fonction des cépages
- décoloration des feuilles (rougissement sur cépages rouges, jaunissement sur cépages jaunes)
- dessèchement des rafles avec des inflorescence avortées ou des baies flétries
- un aoûtement absent ou partiel des sarments qui peut donner un port retombant à la souche atteinte
- un flétrissement partiel ou total pouvant aller jusqu'à la chute complète des grappes.

L'expression des symptômes n'est visible qu'un an après la contamination et quelquefois plus.

Scaphoideus titanus
adulte



Larves de *Scaphoideus titanus*



Symptômes de flavescence dorée



DATE DE TRAITEMENT POUR PACA / SUD DRÔME : les cartes sont en ligne pour le sud Drôme ([ici](#)) et pour PACA ([ici](#)). Le communiqué a été validé ([ici](#)).

Zones à 2 traitements, à 3 traitements et vignes mères :

T1 du 1er au 12 juin.

Conventionnel : T2 du 15 au 26 juin (renouvellement de la 1re intervention à 14 jours) / T3 courant juillet selon l'émergence des adultes.

AB pour zones à 3 traitements : T2 du 11 au 22 juin / T3 du 21 juin au 2 juillet (2 renouvellements à 10 jours).

AB pour zones à 2 traitements : T2 du 11 au 24 juin (renouvellement de la 1re intervention à 10-12 jours).

Zones à 1 traitement :

du 8 au 19 juin.

Ravageurs


VERS DE LA GRAPPE

Biologie

Le terme « vers de la grappe » recouvre trois espèces en vigne : Eudémis (*lobesia botrana*), Cochylis (*Eupoecilia ambiguella*) et Eulia (*Argyrotaenia ljugiana*).

Dans notre région ce sont principalement l'Eudémis et la Cochylis qui sont présentes.

Eudémis



Cochylis



Adultes et larves (source : INRAE)

VERS DE LA GRAPPE (suite)

Biologie

La différence principale entre ces deux espèces réside dans le nombre de générations : deux générations pour la Cochylys, trois générations pour l'Eudémis.

Deuxième génération: Le vol de deuxième génération débute fin mai/début juin et se termine début juillet. Le vol est plus rapide que celui de la première génération car les températures sont plus élevées. Les œufs, pondus exclusivement sur jeunes baies, donnent naissance en une semaine à des larves qui vont très rapidement pénétrer dans les grains (24 à 48 heures). Les dynamiques de vols, de pontes et d'éclosions sont proches pour eudémis et cochylis. Par contre, la durée de l'évolution larvaire est différente: elle est de l'ordre de 3 semaines pour eudémis et 6 semaines pour cochylis.



Photo: CA26



Photos issues du
« Guide des
Vignobles Rhône
Méditerranée »

Observations

Le vol de G2 se poursuit dans les zones très précoces, précoces. Premières captures dans les zones médianes et tardives.

Premières pontes en secteur précoce.

Bilan fin de 1^{ère} génération: observation des glomérules (du 11 mai au 9 juin)

Secteur de précocité	Nb de parcelles observées	Nb de parcelles > au seuil de nuisibilité*
Secteurs précoces	115	13
Secteurs médians	50	4
Secteurs tardifs	71	3

*Seuil de nuisibilité : 10 glomérules pour 100 grappes. Le dépassement de ce seuil peut justifier une intervention en deuxième génération.

Données de la modélisation

Prévisions du modèle ACTIV

	Début du vol de G2	Début des pontes de G2	Premières larves âgées (L3)
Secteur très précoce	En cours	En cours	Premières larves L3
Secteur précoce	En cours	En cours	À partir du 11 juin
Secteur médian	En cours	À partir du 13 juin	À partir du 19 juin
Secteur tardif	À partir du 13 juin	À partir du 16 juin	À partir du 22 juin
Secteur très tardif	À partir du 18 juin	Trop tôt	Trop tôt

VERS DE LA GRAPPE (suite)

Analyse de risque

Cas général :



Faible présence de larves de G1 en 2026



Autres cas :



Présence de larves de G1 supérieure à 10% de glomérules (dépassement du seuil).



Vérifier les débuts de vols de G2 en zones tardives.

Méthodes alternatives



Des **produits de biocontrôle** peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte (ex: Bacillus Thuringiensis, Trichogramma...). La liste des biocontrôles est disponible [ici](#).

LA PYRALE DU DAPHNE : *Cryptoblabes gnidiella*

Biologie

Ce lépidoptère fait partie de la famille des pyrales. Il est très polyphage (plus de 80 plantes-hôtes), est attiré par le sucre, le miellat sécrété par les cochenilles ou par des raisins déjà attaqués ou très mûrs. Le nombre de générations peut atteindre quatre à cinq dans le Sud. Les femelles s'accouplent au cours du mois de juin. Elles pondent en moyenne 150 œufs. Les premières larves sont visibles fin juin-début juillet. Elles se nourrissent d'abord du miellat des cochenilles. S'il y a peu de miellat, les jeunes larves peuvent consommer des baies peu sucrées. Les larves plus âgées grignotent superficiellement la peau des raisins. Elles ne font pas de perforation comme le fait l'eudémis. Cinq stades larvaires se succèdent. Les larves des derniers stades sont beaucoup plus grosses (12-15mm) que celles de l'eudémis (moins de 10 mm).

La pyrale du Daphné




Larve et adulte (source : CA30)

LA PYRALE DU DAPHNE : *Cryptoblabes gnidiella* (suite)

Observations

Quelques papillons piégés en zone littorale à Saint Julien les Martigues, Port de Bouc, Mas Thibert (13).



Analyse de risque



Méthodes alternatives



Des **produits de biocontrôle** peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte (ex: Bacillus Thuringiensis, Trichogramma...). La liste des biocontrôles est disponible [ici](#).

Mesures prophylactiques :

- Réduction du pool de papillons pour l'année suivante, par élimination des grappes « momifiées » lors de la taille en hiver.

Informations

Parcelles natures :

Le réseau « parcelles natures » est un réseau de parcelles dont cinq rangs ne reçoivent aucune protection phytosanitaire.

L'observation de ce réseau est financée par la région Sud Provence Alpes Côte d'Azur.

Réglementaire

NOTE TECHNIQUE NATIONALE



Les champignons responsables du Mildiou, de l'Oïdium, du Black rot et du Botrytis sur vigne sont exposés à des risques de résistance vis-à-vis de plusieurs familles de produits phytosanitaires. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la note commune de gestion de la résistance 2026 - [ICI](#)



Cliquez sur les vignettes pour retrouver les notes complètes



AMBROISIE



Une plante envahissante dangereuse pour la santé. Chacun doit agir !

Les plantules d'Ambroisies à feuilles d'armoise sont de sortie et sont (déjà) présentes dans notre région. Les cotylédons, ronds et souvent rouges sur le dessous, sont encore bien visibles sur les plantules.

Il est donc temps de (re)partir à la chasse, pour passer un été serein !
Pensez à vous protéger avec des gants !



L'objectif de la lutte contre les ambroisies est d'interrompre leur cycle de développement, afin d'éviter la dispersion de pollen et la production de graines.

- Sur ma propriété : je l'arrache et la laisse sur place.
- Hors de ma propriété : je signale la zone infestée.
- Hors de ma propriété, sur un terrain public ouvert au public : s'il y a seulement quelques plants, je les arrache, les laisse sur place et signale la zone.

Si vous observez de l'ambrosie, signalez la plante sur la plateforme « Signalement Ambrosie » :

- Site web : <https://www.signalement-ambrosie.fr/>
- Application mobile Signalement Ambrosie (disponible sur Android et App Store)
- Mail : contact@signalement-ambrosie.fr
- Téléphone : 0 972 376 888

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez regarder notre vidéo : [«Comment reconnaître une plantule d'Ambrosie à feuilles d'armoise ?»](#) »

DATURA STRAMOINE : *Datura stramonium*

Taxonomie :

Nom scientifique actuel : *Datura stramonium* L., 1753.

Classe : Dicotylédones – Ordre : Solanales.

Famille : Solanaceae.

Genre : *Datura* - Espèce : *stramonium* - Code OEPP: [DATST].

Noms vernaculaires : Pomme épineuse, chasse taupes, herbe des sorciers.



Le datura est une plante annuelle herbacée de la famille des solanacées produisant des alcaloïdes atropiniques, substances toxiques pour l'homme et l'animal. Soyez vigilant !

Cliquer sur l'image pour lire la note complète

Plante robuste, à tige épaisse, se ramifiant en parasol.

Feuilles pétiolées, entières ou souvent grossièrement dentées.

Fruit: grosse capsule ovoïde généralement épineuse (③).

Fleur solitaire, grande, blanche ou mauve, pédicellée, pentamère (①); calice tubulaire à lobes dentiformes; corolle en trompette, plissée longitudinalement, à lobes à peine marqués, mais à apex matérialisés par de longs mucrons (①, ②).



Datura ferox



Datura wrightii



Datura stramonium

Cliquer ici pour voir la fiche d'identification complète

2 pérennes

4 espèces présentes en France

2 annuelles

Datura wrightii,
Datura innoxia (en bas à droite)



Datura ferox



Datura stramonium



Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation.

Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Comité de rédaction

Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône Didier RICHY

Chambre d'Agriculture de la Drôme Elsa ALARD, Alixe SANQUER

Chambre d'Agriculture du Var Julie MAZEAU

Chambre d'Agriculture de Vaucluse Raphaël GONZALES, Pauline VEZIN



Observations

Association des Vignerons de la Sainte Victoire

CAPL

Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône (13)

Chambre d'Agriculture de la Drôme (26)

Chambre d'Agriculture des Hautes Alpes (05)

Chambre d'Agriculture du Var (83)

Chambre d'Agriculture de Vaucluse (84)

CTIFL- La Tapy

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

GOVERNEMENT
*Liberté
Égalité
Fraternité*



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



Vous abonner



Devenir
observateur
& contact



Tous les BSV
PACA