Indices de Fréquence de traitement de la région PACA

Le 70ème centile de l'IFT (Indice de Fréquence de Traitement phytosanitaire) correspond à la valeur de l'IFT en dessous de laquelle se situent 70 % des surfaces d'une culture donnée dans une région.

Viticulture (cuve)

Enquête PK 2024

IFT (toutes surfaces)				
	Moyen	Biocontrôle	30e percentile	70e percentile
Viticulture Provence Méditerranée	7,5	2,8	4,9	9.8
Viticulture Vallée Rhône Alpes Sud	11,4	2,8	8,5	14,2

IFT en AB				
	Moyen	Biocontrôle	30e percentile	70e percentile
Viticulture Provence Méditerranée	7,3	4,1	4	9,9
Viticulture Vallée Rhône Alpes Sud	9,9	4,6	7	12

Arboriculture

Enquête PK 2024

	IFT toutes surfaces PACA			IFT en AB PACA		
	Moyen	Biocontrôle	70e percentile	Moyen	Biocontrôle	70e percentile
Pomme de table	25,8	7,2	33,2	15,6	9,1	18,6
Cerise	7,8	0,6	9,5	ns	ns	ns
Raisin de table	13,4	2,9	15,6	7,8	4	9,9
Pêche	22,9	3,5	26,4	ns	ns	ns
Abricot	7,7	1,7	9,2	ns	ns	ns
Prune	9	1,7	10,5	ns	ns	ns
Olive	1,5	0,3	2	1,2	ns	1,6

Source : SSP – Agreste – Enquêtes Pratiques culturales (PK)

Grandes cultures

Enquête PK 2021 (en complément des enquêtes 2017 et 2014)

IFT total (toutes parcelles) **France** (sauf pour Blé dur)				
	Moyen	IFT moyen hors biocontrôle	30e percentile	70e percentile
Blé dur PACA	2,2			2,9
Blé dur	4,4	4,3	3,4	5,3
Blé tendre	5,1	5,1	4	6
Triticale	2,7	2,7	1,9	3,5
Colza	6,4	6,3	5,1	7,6
Tournesol France	2,4	2,4	2	3
Pois protéagineux	2,4	4,3	3,5	5,3
Maïs fourrage	2,9	2,4	1,9	2,8
Maïs grain	2,9	2,9	2,3	3,5
Betterave sucrière	6,7	6,7	5,6	7,7
Pomme de terre	19,8	19,1	16,3	23,5
Féverole	2,8	2,8	1,2	4,1
Soja	1,4	1,4	0,5	2,0
Lin fibre	5,2	5,2	4,1	6,0
Lin Oléagineux	3,2	3,2	2,3	4,1
Orge de printemps	3,2	3,2	2,5	3,9
Orge d'hiver	4,7	4,7	3,8	5,6
Avoine de printemps		1,5	0,4	2,4
Avoine d'hiver		2	1,0	2,8
Sorgho		2,1	1,5	2,7

Source : SSP – Agreste – Enquêtes Pratiques culturales (PK)

Cultures légumières

Enquête PK 2022

Especes avec IFT à l'echelle de PACA

Espèce	Moyen	IFT moyen hors biocontrôle	70e percentile
Chou feuille (hors à choucroute) (Ensemble)	3,9	3,7	3,1
Fraise (Plein air ou abri bas)	ns	ns	ns
Fraise (Sous serre ou abri haut)	4	3	4,8
Fraise (hors sol)	8,2	7	10,5
Fraise (Ensemble)	6,7	5,6	7,9
Melon (Plein air ou abri bas)	4,6	3,4	5,5
Melon (Sous serre ou abri haut)	2,9	2,3	3
Melon (Ensemble)	4,5	3,3	5,8
Potiron (Ensemble)	0,8	0,6	1
Salade chicorée et laitue (Plein air ou abri bas)	4,8	4,7	5,9
Salade chicorée et laitue (Sous serre ou abri haut)	7,3	6,4	8
Salade chicorée et laitue (Ensemble)	6,9	6	8
Tomate (Plein air ou abri bas)	9,7	8,9	12,9
Tomate (Sous serre ou abri haut)	6,3	3,6	8,8
Tomate (Hors sol)	ns	ns	ns
Tomate (Ensemble)	8,8	7,4	11,8

IFT France

Espèce	Moyen	IFT moyen hors biocontrôle	70e percentile
Carotte (Ensemble)	7	6,6	8,6
Chou de Bruxelles (Ensemble)	10,1	9,6	13,9
Chou à inflorescence (Ensemble)	2,2	2,2	2,8
Oignon (Ensemble)	9,6	9,6	12,9
Salade mâche (Ensemble)	2	1,9	3